

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre primene medicinskog sredstva pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu!

**HYPROMELOZA-P®**  
(Hipromeloza 5 mg/ml)

Kapi za oči, rastvor

**Proizvođač:** UNIMED PHARMA spol sro, Oriškova 11, Bratislava, Republika Slovačka

**Nosilac upisa u Registar medicinskih sredstava:**  
UNIMED PHARMA s.r.o., Predstavništvo, Španskih boraca 22b, Beograd, Srbija

**Sastav:** *Aktivna supstanca:*

Hipromeloza 5 mg u 1 ml rastvora

*Pomoćne supstance:*

Dekspantenol, benzalkonijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-edetat, voda za injekcije.

**Dejstvo:** HYPROMELOZA-P® je proizvod koji vrši protektivnu epitelizaciju, dezinfekciju i ima efekat vlaženja. Na površini rožnjače i konjunktive hipromeloza stvara privremen zaštitni film, i tako čini spoljašnju površinu vlažnom i služi kao zamena u slučaju nedovoljnog stvaranja suza. Dovodi do brzog smirivanja u slučaju manjih iritacija oka neinfektivnog porekla. Otklanja osećaj “suvoće oka”. Prisustvo dekspantenola (provitamin vitamina B<sub>5</sub>) doprinosi bržoj regeneraciji ćelija na površini kornee (epitelizacija).

**Indikacije:** HYPROMELOZA-P® koristi se za lečenje u svim slučajevima koji zahtevaju stvaranje zaštitnog filma na površini rožnjače i konjunktive. Koristi se u slučaju sindroma suvog oka (keratoconjunctivitis sicca) na pr. Sjogrenovog sindroma, u slučaju manjih erozija rožnjače, upadanja sitnih čestica u konjunktivalnu kesu ili posle operacija.

Upotrebljava se i za ublaživanje tegoba koje su posledica iritacije očiju vetrom, prašinom, dimom, zagađenom atmosferom, kontaktnim sočivima, i dr. kao i smanjivanje umora očiju kod dugotrajnog čitanja, vožnje, gledanja televizije ili sedenja ispred kompjutera.

Preparat mogu da koriste odrasli, mladi i deca.

**Kontraindikacije:** HYPROMELOZA-P® ne sme se koristiti u slučaju preosetljivosti na pojedine komponente proizvoda i istovremeno sa mekim kontaktnim sočivima. Takođe u akutnoj fazi kod hemijskog oštećenja oka, kapi ne treba koristiti do potpunog odstranjivanja hemikalije i mrtvog tkiva iz oka.

**Neželjena dejstva:** Izuzetno retko mogu se javiti: iritacija oka, hiperemija, svrab i slepljivanje trepavica.

U slučaju eventualne pojave neuobičajenih reakcija konsultujte oftalmologa.

**Interakcije:** HYPROMELOZA-P® ne sme istovremeno da se koristi sa kapima za oči koje sadrže soli metala. Ukoliko koristite i druge lekove, porazgovarajte sa svojim oftalmologom o podesnosti njihove istovremene upotrebe. Uopšteno se preporučuje najmanje 5 minuta između primene drugih preparata za oči i preparata HYPROMELOZA-P®.

**Doziranje:** Doziranje je individualno; ukapava se u konjunktivalnu kesu 1-2 kapi, 2-3 puta dnevno. Po potrebi može se davati i 1-2 kapi svaki sat.

**Posebna upozorenja:** Ako nakon 2 dana od početka primene ne prestanu simptomi ili se čak pogoršaju, obratite se svom oftalmologu, koji će vas pregledati i eventualno preporučiti drugi vid terapije.

Neposredno po primeni, može se javiti zamućen vid, koji može umanjiti sposobnost upravljanja motornim vozilom i rada na mašinama. Zbog toga se preporučuje da se ove aktivnosti sprovedu najmanje 20 minuta posle primene ovih kapi.

Nije dozvoljeno nošenje mekih kontaktnih sočiva istovremeno kada se primenjuje i preparat. Pre upotrebe preparata neophodno je skinuti meka kontaktna sočiva i vratiti ih najranije 30 minuta posle primene.

Ako se kapi slučajno progutaju ne očekuju se nikakva sporedna dejstva čak ni kod dece. U slučaju da dete pregleda pedijatar, ako se jave neki problemi preporučuje se uzimanje velike količine tečnosti.

**Način primene:**

Preparat je namenjen okularnoj upotrebi po otvaranju.

Odvrne se poklopac, pacijent nagne blago glavu unazad, okrene bočicu na dole i ukapa propisani broj kapi u donju konjunktivalnu kesicu pritiskajući plastičnu bočicu. Pazite da vrhom bočice ne dodirne oko ili trpavice. Posle primene zavrnuti čvrsto poklopac da bi se izbegla kontaminacija. Bočica se čuva u uspravnom položaju.

**Pakovanje:** 1 x 10 ml

**Način čuvanja:**

Čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne čuvati u frižideru/ne zamrzavati. Čuvati van domašaja dece.

**Rok upotrebe:** Ne sme se koristiti nakon isteka roka upotrebe utisnutog na pakovanju. Posle prvog otvaranja originalnog pakovanja lek se koristi najduže 28 dana.

**Broj Rešenja:** 515-02-00970-14-001 od 18.07.2014

CE<sub>2265</sub>

STERILE	A
---------	---